

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ AMENINȚĂ SĂ SE RĂSPÂNDEASCĂ! FIȚI ATENȚI LA SEMNELE EI ȘI ANUNȚAȚI DIN TIMP MEDICUL VETERINAR!

Cine cauzează pesta porcină africană?

Pesta porcină africană este cauzată de un virus.

La ce specii este întâlnită boala?

La porcii domestici și porcii mistreți europeni de toate vârstele, indiferent de gen.

Pot oamenii să se infecteze cu acest virus?

NU! Virusul poate determina pagube importante prin procentul de mortalitate ridicat, prin dificultățile de eradicare a bolii și prin restricțiile impuse comerțului.

Unde evoluează boala în prezent în Europa?

În Uniunea Europeană: Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Italia (insula Sardinia), în Federația Rusă, Ucraina, Belarus, Moldova.

În România: Satu Mare, Bihor, Sălaj, Tulcea, Constanța, Brăila, Ialomița, Galați, Călărași, Ilfov, Buzău, Giurgiu.

Cât de mult durează de la infectarea porcilor, până la apariția semnelor de boală?

3-15 zile, dar în forma acută de boală semnele pot apărea în 3-4 zile.



Cum arată un porc bolnav de pesta porcină africană?

Nu există semne specifice care să indice boala, semnele pot fi atribuite și altor boli;

- mortalitatea ridicată, aproape de 100%, intervenită într-un timp extrem de scurt;
- temperatură foarte ridicată (40,5 – 42 °C) și stare febrilă;
- roșeață sau învinețire a pielii, a marginilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului și pieptului;
- lipsa poftei de mâncare, apatie și împleticire în mers, care pot apărea cu 24 - 48 de ore înaintea morții;
- vomități, diaree (uneori cu sânge) și urdori la ochi.





Cum se transmite virusul?

- Prin contact direct între animalele sănătoase și cele bolnave sau indirect, prin:
- hrănirea porcilor cu resturi de la bucătărie, când originea cărnii de porc folosită la gătit nu este cunoscută;
 - alți vectori infectați ca: vehicule, haine, adăposturi în care a evoluat boala.
 - toate secrețiile, excrețiile, fluidele, țesuturile provenite de la animalele infectate, bolnave și moarte, precum și animale care au supraviețuit îmbolnăvirii și s-au recuperat;
 - în mediul extern: virusul poate rezista în fecale 6-10 zile, în produsele din porc mai multe luni, iar în carnea congelată mai mulți ani. **Este cel mai rezistent virus, ceea ce-l face foarte periculos.**

Pot fi animalele vaccinate împotriva peștei porcine africane?

Nu există vaccin împotriva acestei boli! Măsurile de prevenire (igienă alimentară și a exploatațiilor, mișcările animalelor și măsurile de control aplicate de autoritățile împuternicite sunt singurele metode care pot ține boala departe.

Există tratament pentru această boală?

NU!

Ce fac în cazul în care suspectez că un porc este bolnav de pestă porcină africană?

- anunț imediat medicul veterinar împuternicit de liberă practică din localitate, ori medicul veterinar oficial, ori Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din județul meu;
- izolez imediat animalul bolnav, sau cadavrul de alte animale fără semne de boală și îl prezint medicului veterinar;
- mă oblig să nu arunc cadavrul animalului în locuri neamenajate.

Ce vor face serviciile veterinare în cazul apariției unui focar de pestă porcină africană?

- toți porcii vor fi uciși, iar proprietarii vor primi despăgubiri pentru pierderile suferite;
- toate cadavrele porcilor uciși vor fi distruse în condiții de maximă securitate astfel încât să se împiedice orice transmitere a bolii;
- circulația animalelor va fi pusă sub restricții în perioada evoluției bolii, iar animalele din curțile aflate în perimetrul de restricții vor fi ținute sub observație;
- exploatațiile infectate vor fi dezinfectate, dezinsectate și deratizate, primind aprobarea pentru repopulare când condițiile sunt întrunite.

De reținut:

Este mai bine să raportați orice suspiciune de boală, chiar dacă ea nu se va confirma, decât să nu raportați deloc!

Contribuția dumneavoastră este esențială în menținerea indemnității județului Bistrița-Năsăud!

Telefonul DSVSA BN la care se va anunța orice suspiciune este 0263224974